

③ n°1 (3 points) « Cours » Répondre sur cette feuille :

1) Compléter les phrases :

a) « n » étant un nombre entier, un multiple de 5 se note : 5n

b) « n » étant un nombre entier, un nombre pair s'écrit sous la forme : 2n

c) « n » étant un nombre entier, le nombre entier qui le précède se note :

2) Pour passer de l'expression du 1^{er} membre à celle du deuxième membre, a-t-on développé, factorisé ou ni l'un ni l'autre ? (Ne pas justifier).

$(5-3b) \times 2 = 10-6b$ on a développé

$11+(y \times 7) = 7y+11$ ni l'un ni l'autre

$25p+p^2 = p \times (25+p)$ on a factorisé

② n°2 (3,5 points) « Développement - réduction »

Développer et réduire les expressions, en écrivant au moins une étape intermédiaire pour B et C :

$Z = (y-3)(y+3) = y^2 - 9$ Identité remarquable

$A = -4y(6-3y) = -24y + 12y^2$

$C = 3(2y+1) - (-5+y^2-6y)$

$C = 6y + 3 + 5$

$C = 12y + 8 - y^2$

② n°3 (2 points) « Factorisation à l'aide de identité remarquable »

Factoriser les expressions, en écrivant au moins une étape intermédiaire :

$A = y^2 - 49 = y^2 - 7^2 = (y+7)(y-7)$ Identité remarquable

$B = 144 - 16y^2 = 12^2 - (4y)^2 = (12+4y)(12-4y)$

$B = \text{} (3+4) \text{} (3-4) = \text{} (3+4)(3-4)$

6

n°4 (6 points) Question brevets des colléges Compétence évaluée : Calculer en utilisant le langage algébrique.

On considère l'expression suivante : $E = (3x - 5)^2 + (3x - 5)(7x - 4)$

La phrase explicative du début n'est pas facultative.

1) Résoudre l'équation : $(3x - 5)(10x - 9) = 0$.

On prend le produit de facteurs...
 $3x - 5 = 0$ ou $10x - 9 = 0$
 $3x = 5$ ou $10x = 9$
 $x = \frac{5}{3}$ ou $x = \frac{9}{10}$

Les solutions sont :

$\frac{5}{3}$; $\frac{9}{10}$

2) Développer puis réduire E.

zone de brouillon possible ci-dessous

3) $E = (3x - 5)^2 + (3x - 5)(7x - 4)$

$E = (3x - 5)(3x - 5 + 7x - 4)$

$E = (3x - 5)(10x - 9)$

~~$E = (3x - 5)^2 + (3x - 5)(7x - 4)$~~

$E = (3x - 5)(3x - 5) + 21x^2 - 12x - 35x + 20$

$E = 9x^2 - 15x - 15x + 25 + 21x^2 - 47x + 20$

$E = 30x^2 - 77x + 45$

6 n°5 (7 points) « À partir d'un brevet des collègues » Compétence évaluée : Lire, interpréter, graphiques.

Pour cuire des macarons, la température du four doit être impérativement 150 °C.

Depuis quelque temps, le responsable de la boutique n'est pas satisfait de la cuisson de ses pâtisseries. Il a donc décidé de vérifier la fiabilité de son four en réglant sur 150 °C et en prenant régulièrement la température à l'aide d'une sonde.

On a représenté ci-dessous la fonction g avec la courbe représentant l'évolution de la température de son four (en °C) en fonction du temps (en minutes) :

Par lecture graphique, répondre aux questions suivantes sans justifier (sauf quand cela est demandé).

1) Quelle est l'image de 10 par la fonction g ?

0,5 155°C

2) Donner le ou les antécédent(s) de 150.

1 environ 8,7 - 1/2 minutes

3) Pour le point A sur le graphique :

0,5 a) Recopier et compléter l'égalité : $g(7) = 140$

b) Donner une interprétation de la réponse précédente.

1 Cela signifie qu'après le four est

0,5 4) Quelle est la température atteinte au bout de trois minutes ?

(Graphiquement) environ 72°C


5) De combien de degrés Celsius, la température a-t-elle augmenté entre la deuxième et la septième minute ? (Explication nécessaire). A 2 min : environ 50°C

1 d'où : - 50 = 22°C

0,5 6) Au bout de combien de temps, la température de 150 °C nécessaire à la cuisson des macarons est-elle atteinte ? environ 8 min

7) Passé ce temps, que peut-on dire de la température du four ? Expliquer pourquoi le responsable n'est pas satisfait de la cuisson de ses macarons.

1 Comme la température continue à augmenter, et varie ; le four ne s'est pas à 150°C comme souhaité pour la cuisson des macarons.



n° 6 (6,5 points) « Brevet des collèges » Compétences évaluées : Lire, interpréter, tableaux.

Léa pense qu'en multipliant deux nombres impairs consécutifs (c'est-à-dire qui se suivent) et qu'en ajoutant 1, le résultat obtenu est toujours un multiple de 4.

Plusieurs justifications étaient obligatoires.

1) Étude d'un exemple : 5 et 7 sont deux nombres impairs consécutifs.

a) Calculer $5 \times 7 + 1$. $= 35 + 1 = 36$

b) Léa a-t-elle raison pour cet exemple ? $36 : 4 = 9$ (ou $4 \times 9 = 36$)
 donc Léa a raison pour l'exemple

2) Le tableau ci-dessous montre le travail qu'elle a réalisé dans une feuille de calcul d'un tableur.

	A	B	C	D	E
1		Nombre impair	Nombre impair suivant	Produit de ces nombres impairs consécutifs	Résultat obtenu
2	x	2x+1	2x+3	(2x+1)(2x+3)	(2x+1)(2x+3)+1
3	0	1	3	3	4
4	1	3	5	15	16
5	2	5	7	35	36
6	3	7	9	63	64
7	4	9	11	99	100
8	5	11	13	143	144
9	6	13	15	195	196
10	7	15	17	255	256
11	8	17	19	323	324
12	9	19	21	399	400

a) D'après ce tableau, quel résultat obtient-on en prenant comme premier nombre impair 17 ?

En E11, le résultat obtenu est 324

b) Montrer que cet entier est un multiple de 4.

$324 = 4 \times 81$ donc c'est bien un multiple de 4

c) Quelle formule de calcul a pu être saisie dans la cellule D3 ? Aucune justification n'est attendue.

$= (2 * A3 + 1) * (2 * A3 + 3)$ (ou $= B3 * C3$)

3) Étude algébrique :

a) Développer et réduire l'expression $(2x + 1)(2x + 3) + 1$. $= 4x^2 + 6x + 2x + 3 + 1 = 4x^2 + 8x + 4$

b) En déduire que Léa avait raison : le résultat obtenu est toujours un multiple de 4.

----- zone de brouillon possible ci-dessous -----

$4x^2 + 8x + 4 = 4(\quad)$

soit $4 \times n$ avec $n = \quad$



donc ce sera toujours un multiple de 4.

n°7 (2 points) « Brevet des collèges »

(Extrait de Transmath 3^{ème} 2021)

On considère les figures ci-contre :
un triangle équilatéral et un rectangle.

x représente un nombre positif
quelconque, en cm.



Il était précisé : « toutes
les valeurs de x ».

Est-il vrai que les deux figures ont le même périmètre pour toutes les valeurs de x ?

le périmètre du triangle : $(4x + 1) \times 3 = 12x + 3$

----- zone de brouillon possible ci-dessous -----

le périmètre du rectangle :

$(4x + 1,5) \times 2 + 2x \times 2 = \boxed{} = \boxed{}$

Donc les deux périmètres sont les
mêmes pour $\boxed{}$ les x