

# **Continuité sur un intervalle, sens de variation**

Chapitre 1

Classe de T. ES


# I- Langage de la continuité

## 1- Notion intuitive de continuité

$f$  est une fonction définie sur un intervalle  $I$  de  $\mathbb{R}$ .

Lorsque la courbe représentative de  $f$  dans un repère ne présente pas de « saut », c'est-à-dire que cette courbe se trace d'un seul tenant, sans lever le crayon, on dit que  $f$  est continue sur  $I$ .

Exemple :



courbe représentative d'une fonction  $h$  définie sur  $[-1; 3]$ .

La fonction  $h$  représentée ci-dessus n'est pas continue sur  $[-1; 3]$  : on doit lever le crayon pour tracer sa courbe.

En revanche,  $h$  est continue par morceaux, sur  $[-1; 1]$  et sur  $]1; 3]$

# I- Langage de la continuité

## 2- propriétés

- a) Les fonctions de référence (fonctions affines, carré, inverse, racine carrée) sont continues sur chaque intervalle de leur ensemble de définition.
- b) Les fonctions polynômes sont continues sur  $\mathbb{R}$   $ax^n + bx^{n-1} + cx^{n-2} + \dots$
- c) Les fonctions rationnelles (quotient de polynômes) sont continues sur chaque intervalle de leur ensemble de définition.

### Par exemple :

La fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = 3x^2 - x + 1$  est une fonction polynôme, donc elle est continue sur  $\mathbb{R}$ .

La fonction  $g$  définie sur  $] -\infty; 1[ \cup ] 1; +\infty[$  par  $g(x) = \frac{x+1}{x-1}$  est continue sur  $] -\infty; 1[$  et sur  $] 1; +\infty[$  (1 est valeur interdite, la fonction n'est pas définie donc pas continue en 1; la courbe représentative présente donc un saut en 1.)

# II- Théorème des valeurs intermédiaires


## 1- fonction continue et non monotone

### Propriété

Si  $f$  est une fonction définie et continue sur un intervalle  $[a;b]$ ,  
alors, pour tout réel  $c$  compris entre  $f(a)$  et  $f(b)$ , il existe au moins un réel  $\alpha$   
compris entre  $a$  et  $b$  tel que  $f(\alpha)=c$ .

*Autrement dit : Tout réel de l'intervalle  $[f(a); f(b)]$  (ou  $[f(b); f(a)]$ ) possède au moins un antécédent par  $f$ ; pour tout réel  $c$  compris entre  $f(a)$  et  $f(b)$ , l'équation  $f(x)=c$  possède au moins une solution dans l'intervalle  $[a;b]$*


Illustration :



$f$  est continue mais n'est pas monotone sur l'intervalle  $[a; b]$ . L'équation  $f(x) = c$  peut avoir plusieurs solutions.

Remarque :  $\Delta$  est la droite d'équation  $y = c$ ; elle coupe 3 fois la courbe, donc l'équation  $f(x)=c$  possède 3 solutions :  $\alpha_1; \alpha_2; \alpha_3$

## Autre configuration



$f$  n'est pas continue sur l'intervalle  $[a; b]$ . L'équation  $f(x) = c$  peut ne pas avoir de solution.

# II- Théorème des valeurs intermédiaires


## 2- fonction continue et strictement monotone

### Propriété


Si  $f$  est une fonction définie, continue et strictement monotone sur un intervalle  $[a;b]$ , alors, pour tout réel  $c$  compris entre  $f(a)$  et  $f(b)$ , il existe un unique réel  $\alpha$  compris entre  $a$  et  $b$  tel que  $f(\alpha)=c$ .

*Autrement dit : Tout réel de l'intervalle  $[f(a); f(b)]$  (ou  $[f(b); f(a)]$ ) possède un **unique** antécédent par  $f$ ; pour tout réel  $c$  compris entre  $f(a)$  et  $f(b)$ , l'équation  $f(x)=c$  possède une unique solution dans l'intervalle  $[a;b]$*

Illustration :



$f$  est continue et strictement croissante sur l'intervalle  $[a; b]$ . L'équation  $f(x) = c$  admet une unique solution.



$f$  est continue et strictement décroissante sur l'intervalle  $[a; b]$ . L'équation  $f(x) = c$  admet une unique solution.

## II- Théorème des valeurs intermédiaires

### 3- Propriété des fonctions dérivables (admis)

Si une fonction est dérivable sur un intervalle  $I$  alors elle est continue sur  $I$  (la réciproque est fausse).

# III- Sens de variation et dérivation (rappels)

## 1- Tableau de variation

Par convention, les flèches obliques d'un tableau de variation signifient que sur l'intervalle considéré, la fonction est continue et strictement monotone.

On peut donc appliquer le théorème des valeurs intermédiaires.

## 2- Sens de variation d'une fonction dérivable

a) Propriété :

Soit  $f$  une fonction définie, continue et dérivable sur un intervalle  $I$ .

$f$  est croissante sur  $I$  si et seulement si pour tout réel  $x$  de  $I$ ,  $f'(x) \geq 0$ .

$f$  est décroissante sur  $I$  si et seulement si pour tout réel  $x$  de  $I$ ,  $f'(x) \leq 0$ .

$f$  est constante sur  $I$  si et seulement si pour tout réel  $x$  de  $I$ ,  $f'(x) = 0$ .

**Attention :** ne pas confondre le signe de  $f'(x)$  et le signe de  $f(x)$ . Aucun rapport!

b) Extrema :

• Si la fonction  $f$  présente un extremum en  $a$ , alors  $f'(a) = 0$ . (réciproque fausse)



- En revanche, si  $f'$  s'annule en changeant de signe en  $x_0$ , alors  $f$  présente un extremum en  $x_0$ .

illustration :

$x$		$x_0$	
$f'$	-	0	+
$f$			

$f(x_0)$  est un minimum local.

$x$		$x_0$	
$f'$	+	0	-
$f$			

$f(x_0)$  est un maximum local.

exemple :

$x$	-12	4	16	$\alpha$	34
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f$	-3	-1	-6	0	5
$f(x)$		-		0	+