

Les Fonctions affines & linéaires – Problèmes du 1^{er} degré

3	La fonction linéaire	11
3.1	La proportionnalité	11
3.2	Résolution	12
3.3	Définition	13
3.4	Représentation d'une fonction linéaire	13
3.5	Propriétés du coefficient directeur	14
3.6	Propriétés	15
4	Fonction affine	16
4.1	Définition	16
4.2	Comment déterminer une fonction affine ?	17
4.3	Représentation d'une fonction affine	18
4.4	Propriété du coefficient directeur	19
4.5	Fonction affine définie par morceaux	20
5	Optimisation et autres application des fonctions affines	21
5.1	Optimisation	21
5.2	Autre application : conversion d'unité	23

3 La fonction linéaire

La fonction linéaire est la plus simple des fonctions car elle traduit tout simplement le caractère proportionnel de deux quantités.

3.1 La proportionnalité

Avant d'étudier la proportionnalité, il est bon de rappeler ce qu'est la proportionnalité.

Définition 4 : Deux nombres x_1 et x_2 sont proportionnels respectivement aux nombres y_1 et y_2 si leurs rapports sont égaux, c'est à dire que :

$$\frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2} = k \quad k \text{ est le coefficient de proportionnalité}$$

k est parfois appelé coefficient multiplicateur car pour connaître y_1 ou y_2 à partir de x_1 ou x_2 , on effectue une multiplication

$$y_1 = k \times x_1 \quad \text{et} \quad y_2 = k \times x_2$$

Exemples : Les exemples concrets sont nombreux.

- La distance parcourue d est proportionnelle à la vitesse v : $d = vt$.
- Dans un circuit électrique la tension U est proportionnelle à l'intensité du courant I (loi d'Ohm) : $U = RI$
- Le poids d'un objet P est proportionnel à sa masse m : $P = mg$
- Dans une société la répartition du bénéfice est proportionnelle à la part de chaque actionnaire.
- En copropriété, les charges à payer sont proportionnelles à la surface habitée.
- Le prix de n objets identiques est proportionnel au prix d'un objet.
- ...

3.2 Résolution

Problème : Une voiture consomme 22 ℓ pour 275 km, sachant que sa consommation est proportionnelle au nombre de km parcourus, combien consomme-t-elle pour 200 km.

Plusieurs méthodes sont possibles pour résoudre ce problème.

3.2.1 Retour à l'unité : règle de trois

Pour 275 km, on consomme 22 ℓ ,

pour 1 km, on consomme 275 fois moins soit $\frac{22}{275}$ ℓ ,

pour 200 km, on consomme 200 fois plus soit $\frac{22}{275} \times 200 = 16$ ℓ

Réponse : La voiture consomme 16 litres pour 200 km.

3.2.2 Retour à un diviseur commun

Lorsque cela est possible, on cherche un diviseur commun entre deux valeurs d'une quantité. Ici 275 et 200 ont comme diviseur commun 25. Au lieu de revenir à l'unité, on revient au dénominateur commun :

Pour 275 km, on consomme 22 litres, comme $275 = 11 \times 25$

pour 25 km, on consomme 11 fois moins soit $\frac{22}{11} = 2$ ℓ , comme $200 = 8 \times 25$

pour 200 km, on consomme 8 fois plus soit $2 \times 8 = 16$ ℓ

Réponse : La voiture consomme 16 litres pour 200 km.

3.2.3 Tableau de proportionnalité

Cette méthode est basée sur le produit en croix, c'est à dire, en appelant x la quantité cherchée, que :

$$\frac{275}{22} = \frac{200}{x} \Leftrightarrow x = \frac{200 \times 22}{275}$$

Généralement, on remplit le tableau suivant :

275	200
22	x

Pour trouver x il suffit de multiplier la diagonale dont les quantités sont connus (22×200) et diviser par la dernière quantité connue (275).

Deux méthodes sont encore possibles, mais il faut auparavant étudier la fonction linéaire.

3.3 Définition

Définition 5 : Une fonction linéaire est une fonction définie de \mathbb{R} dans \mathbb{R} qui à chaque réel x associe un réel $f(x)$ tel que $f(x) = ax$.

$$\begin{aligned} f &: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f(x) = ax \end{aligned}$$

Le coefficient a s'appelle le **coefficient directeur**.

Exemples : Pour définir une fonction linéaire, il suffit de connaître le coefficient a . Soit f une fonction telle que $f(x) = 2x$

Reprenons l'exemple de la voiture qui consomme 22 litres pour 275 km. Appelons x la distance parcourue et $f(x)$ la consommation.

On peut remplir le tableau suivant :

275	x
22	$f(x)$

On a alors $f(x) = \frac{22x}{275} = 0,08x$


Remarque : Pour déterminer une fonction linéaire, il suffit de connaître une image. Dans l'exemple de notre voiture, on a $f(275) = 22$

La consommation pour 200 km est alors : $f(200) = 0,08 \times 200 = 16$.

3.4 Représentation d'une fonction linéaire

Propriété 1 : La représentation d'une fonction linéaire f est une droite qui passe par l'origine du repère ($f(0) = 0$).
Pour tracer une droite, il suffit de connaître deux points. Comme nous savons que cette droite passe par l'origine, il nous suffit de connaître un seul point qui correspond alors à une image de la fonction f .

Dans l'exemple de notre voiture, nous avons $f(275) = 22$, donc la droite représentant la fonction f passe par le point A(275 ; 22). Nous pouvons ainsi tracer la représentation de la fonction f . En cherchant le point B de la droite d'abscisse 200, nous retrouvons la solution de notre problème.



3.5 Propriétés du coefficient directeur

Représentons les fonctions linéaire suivantes :


$$f_1(x) = 3x \quad f_2(x) = x \quad f_3(x) = \frac{1}{4}x$$
$$f_4(x) = -2x \quad f_5(x) = -x \quad f_6(x) = -\frac{1}{3}x$$

Pour tracer chaque fonction, il faut déterminer un point :

- Pour $f_1(x) = 3x$,
on calcule par exemple $f_1(2) = 3 \times 2 = 6$,
donc la droite (D_1) représentant f_1 passe par le point A(2 ; 6)
- Pour $f_2(x) = x$,
on calcule par exemple $f_2(3) = 3$,
donc la droite (D_2) représentant f_2 passe par le point B(3 ; 3)
- Pour $f_3(x) = \frac{1}{4}x$,
on calcule par exemple $f_3(8) = \frac{1}{4} \times 8 = 2$,
donc la droite (D_3) représentant f_3 passe par le point C(8 ; 2)
- Pour $f_4(x) = -2x$,
on calcule par exemple $f_4(2) = -2 \times 2 = -4$,
donc la droite (D_4) représentant f_4 passe par le point D(2 ; -4)
- Pour $f_5(x) = -x$,
on calcule par exemple $f_5(-3) = -(-3) = 3$,
donc la droite (D_5) représentant f_5 passe par le point E(-3 ; 3)
- Pour $f_6(x) = -\frac{1}{3}x$,
on calcule par exemple $f_6(-6) = -\frac{1}{3} \times (-6) = 2$,

donc la droite (D_6) représentant f_6 passe par le point F(-6 ; 2)

La représentation des six fonctions donne :



Au vue de ces représentations graphique, on constate que :

- Lorsque le coefficient a est positif, c'est à dire pour les représentations (D_1) , (D_2) et (D_3) , les droites sont situées dans les cadrans 1 et 3. Les fonctions f_1 , f_2 et f_3 sont donc croissantes.
- Lorsque le coefficient a est négatif, c'est à dire pour les représentations (D_4) , (D_5) et (D_6) , les droites sont situées dans les cadrans 2 et 4. Les fonctions f_4 , f_5 et f_6 sont donc décroissantes.
- Plus la valeur absolue du coefficient a est grande, plus la droite est verticale. En effet, de (D_3) à (D_1) les droites sont de plus en plus verticales, leurs coefficients directeurs passent de $\frac{1}{4}$ pour (D_3) à 3 pour (D_1) .

3.6 Propriétés

Definition 6 : On appelle taux d'accroissement T de la fonction f entre les quantités x_1 et x_2 , la quantité définie par :

$$T = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

Propriété 2 : Une fonction linéaire est **croissante** respectivement **décroissante** si, et seulement si, son coefficient directeur a est **positif** respectivement **négatif**.

Démonstration : Pour montrer la croissance d'une fonction, il suffit de montrer qu'elle conserve la relation d'ordre c'est à dire un taux d'accroissement T positif. Pour montrer la décroissance d'une fonction, il suffit de montrer qu'elle inverse la relation d'ordre c'est à dire un taux d'accroissement T négatif. Montrons que le taux d'accroissement T d'une fonction linéaire est constant.

$$T = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{ax_2 - ax_1}{x_2 - x_1} = \frac{a(x_2 - x_1)}{x_2 - x_1} = a$$

- Si $a > 0$ le taux d'accroissement est positif donc la fonction f est croissante.
- Si $a < 0$ le taux d'accroissement est toujours négatif donc la fonction est décroissante.

Règle 3 : Si une fonction f est linéaire alors :

$$\begin{aligned} \forall x_1 \in \mathbb{R}, \forall x_2 \in \mathbb{R} \quad f(x_1 + x_2) &= f(x_1) + f(x_2) \\ \forall x \in \mathbb{R}, \forall k \in \mathbb{R} \quad f(kx) &= k \times f(x) \end{aligned}$$

Ces deux propriétés sont appelées propriété additive et multiplicative. Elles caractérisent la proportionnalité.

4 Fonction affine

4.1 Définition

Définition 7 : Une fonction affine est une fonction définie de \mathbb{R} dans \mathbb{R} qui à un réel x associe la quantité $f(x) = ax + b$ où a et b sont deux réels fixés.

$$\begin{aligned} f &: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f(x) = ax + b \end{aligned}$$

Le coefficient a s'appelle le **coefficient directeur**.

Le coefficient b s'appelle l'**ordonnée à l'origine**.

Cas particuliers :

- Si $b = 0$, la fonction affine f est une fonction linéaire : $f(x) = ax$
- Si $a = 0$, la fonction affine f est une fonction constante : $f(x) = b$

Remarque : Dans une fonction affine ce n'est pas $f(x)$ qui est proportionnel à x mais sa variation.

Exemples :

1) Un chauffeur de taxi pratique les prix suivants :

- 2,50 € la prise en charge
- 0,30 € par km parcouru

Quel est le prix $f(x)$ demandé par le taxi pour une course de x km ?

$$f(x) = 0,30x + 2,50$$

2) Une voiture possède un réservoir de 54 litres et consomme 6 litres pour 100 km. Au départ le réservoir est plein. La voiture parcourt x km. Quel est le nombre de litres $g(x)$ restant dans le réservoir ?

Comme la voiture consomme 6 ℓ pour 100 km, elle consomme 0,06 ℓ pour 1 km et donc 0,06 x ℓ pour x km, donc :

$$g(x) = -0,06x + 54$$

4.2 Comment déterminer une fonction affine ?

Dans une fonction affine, nous avons besoin de deux informations pour déterminer les coefficients a et b .

4.2.1 On donne deux images

Règle 4 : Soit f une fonction affine telle que $f(x) = ax + b$. Si on connaît deux images telle que $y_1 = f(x_1)$ et $y_2 = f(x_2)$, alors on a :

$$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad \text{et} \quad b = f(x_1) - ax_1$$

Démonstration : Si $y_1 = f(x_1)$ et $y_2 = f(x_2)$ on peut écrire :

$$y_1 = ax_1 + b \quad \text{et} \quad y_2 = ax_2 + b$$

Calculons la quantité $y_2 - y_1$:

$$y_2 - y_1 = ax_2 + b - (ax_1 + b) = ax_2 + b - ax_1 - b = a(x_2 - x_1)$$

On a donc bien : $a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

De $y_1 = ax_1 + b$ on en déduit que : $b = y_1 - ax_1 = f(x_1) - ax_1$

Exemple : Déterminer la fonction affine f telle que : $f(-2) = -4$ et $f(1) = 5$:

On calcule le coefficient directeur :


$$a = \frac{f(1) - f(-2)}{1 - (-2)} = \frac{5 - (-4)}{1 + 2} = \frac{9}{3} = 3$$

On calcule l'ordonnée à l'origine : $b = f(1) - 3 \times 1 = 5 - 3 = 2$

La fonction affine recherchée a pour expression : $f(x) = 3x + 2$.

4.2.2 On donne la représentation graphique

Soit le représentation (D) d'une fonction affine f :



On sait que le coefficient directeur $a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$.

Il correspond donc à une différence d'ordonnées Δy sur une différence d'abscisses Δx entre deux points de la droite correspondante à la représentation de la fonction f . Sur le graphique, on peut donc repérer deux points A et B et trouver ainsi a :

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\text{différence d'ordonnées}}{\text{différence d'abscisses}}$$

Pour déterminer l'ordonnée à l'origine b , il suffit de lire l'ordonnée du point d'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées :

b = ordonnée du point d'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées

Dans l'exemple ci-dessus, on trouve donc : $f(x) = \frac{3}{2}x + 2$

4.3 Représentation d'une fonction affine

Propriété 3 : La représentation d'une fonction affine est une droite mais qui ne passe pas nécessairement par l'origine si $b \neq 0$. Pour tracer cette droite, nous avons besoin de deux points qui correspondent à deux images.

Cas particuliers

Si $b = 0$ la droite passe par l'origine (fonction linéaire).

Si $a = 0$ la droite est horizontale (fonction constante)

Exemple : Représenter les fonction f , g et h définies par :


$$f(x) = 2x - 3 \quad ; \quad g(x) = \frac{1}{2}x + 4 \quad ; \quad h(x) = -\frac{1}{2}x - 2$$

Le choix des images pour tracer la droite est arbitraire. Cependant, ce choix doit tenir compte de l'échelle du repère que l'on choisit, ainsi que de la précision du tracé de cette droite. Pour ces deux raisons, dans la mesure du possible on calculera l'image de 0, car elle est facile à calculer et correspond à l'ordonnée à l'origine et l'on choisira la deuxième image de façon à obtenir un point qui n'est pas trop proche du premier de façon à obtenir un bon tracé de la droite.

Calculons deux images pour les fonctions f , g et h .

- Pour f : $f(0) = -3$ et $f(3) = 2 \times 3 - 3 = 3$.
Donc la représentation de la fonction f passe par les points A(0; -3) et B(3; 3).
- Pour g : $g(0) = 4$ et $g(-4) = \frac{1}{2} \times (-4) + 4 = 2$.
Donc la représentation de la fonction g passe par les points C(0; 4) et D(-4; 2).
- Pour h : $h(0) = -2$ et $h(4) = -\frac{1}{2} \times 4 - 2 = -4$.
Donc la représentation de la fonction h passe par les points E(0; -2) et F(4; -4).

On trace ensuite les fonctions f , g et h .



4.4 Propriété du coefficient directeur

Propriété 4 : Le taux d'accroissement d'une fonction affine est égale au coefficient directeur. On a donc

- Une fonction affine est croissante, respectivement décroissante, si, et seulement si, le coefficient directeur a est positif, respectivement négatif.
- Les représentations de deux fonctions affines sont parallèles si, et seulement si, leurs coefficients directeurs sont égaux.

4.5 Fonction affine définie par morceaux

Définition 8 : Une fonction affine peut changer d'expression suivant l'intervalle dans lequel se situe la variable x . On dit alors que la fonction est définie par morceaux.

Exemple : Soit la fonction f définie sur \mathbb{R} telle que :

$$f : \begin{cases} f(x) = x + 1 & \text{si } x \in]-\infty ; 2[\\ f(x) = -x + 5 & \text{si } x \in [2 ; +\infty[\end{cases}$$


Pour calculer l'image de -3 on prendra la première expression car $-3 \in]-\infty ; 2[$, pour l'image de 4 on prendra la deuxième car $4 \in [2 ; +\infty[$.

$$f(-3) = -3 + 1 = -2 \quad \text{et} \quad f(4) = -4 + 5 = 1$$

Remarque : Lorsque l'on calcule l'image de 2 , on doit prendre la deuxième expression $f(2) = -2 + 5 = 3$, cependant lorsque l'on utilise la première expression $f(2) = 2 + 1 = 3$, on trouve le même résultat. On dit alors que la fonction f est **continue** en $x = 2$, il n'y aura donc pas de « cassure » dans la représentation de la fonction f . Comme la fonction f , continue en $x = 2$, possède deux expressions, sa représentation graphique sera deux demi-droites. Il sera alors nécessaire de déterminer au moins trois points pour tracer la représentation de la fonction f .

- Comme $f(-3) = -2$ la représentation de la fonction f passe par $A(-3 ; -2)$
- Comme $f(2) = 3$ la représentation de la fonction f passe par $B(2 ; 3)$
- Comme $f(4) = 1$ la représentation de la fonction f passe par $C(4 ; 1)$

On obtient alors la représentation suivante :



5 Optimisation et autres application des fonctions affines

5.1 Optimisation

Une agence de voiture propose deux types de contrat de location d'une voiture pour une journée.

- Contrat N°1 : 30 € de forfait et 0,40 € par km
- Contrat N°2 : 57 € de forfait et 0,25 € par km

Pour x km parcourus, le prix à payer est $f(x)$ pour le premier contrat et $g(x)$ pour le second.

- 1) Donner les expressions de $f(x)$ et $g(x)$.
- 2) Construire dans un même repère les représentations de f et g pour les valeurs de x comprise entre 0 et 500 km.
- 3) Indiquer, en utilisant le graphique, le type de contrat le plus avantageux suivant le nombre de km parcourus.
- 4) Retrouver ces résultats par le calcul.



- 1) Les expressions des fonctions sont immédiates, on a :

$$f(x) = 30 + 0,40x \quad \text{et} \quad g(x) = 57 + 0,25x$$

- 2) Pour représenter les fonction f et g , il faut déterminer deux images pour chacune des fonctions. Comme la variable a une amplitude donnée (entre 0 et 500km), il est intéressant, pour la précision du graphique de prendre les image de 0 et 500. On peut représenter les résultats dans un tableau.


x	0	500
$f(x)$	30	$f(500) = 30 + 0,4 \times 500 = 230$
$g(x)$	57	$g(500) = 57 + 0,25 \times 500 = 182$

La représentation de f passe donc par les points A(0 ; 30) et B(500 ; 230).

La représentation de g passe donc par les points C(0 ; 57) et D(500 ; 182).

Il reste à déterminer les unités graphiques. Comme x varie entre 0 et 500, et y entre 0 et 230 on peut prendre :

sur les abscisses : 2 cm = 100 km et sur les ordonnées : 1 cm = 20 €.



- 3) Si l'on veut déterminer le contrat le plus avantageux suivant le nombre de km parcourus, le prix doit être le plus petit possible. On cherche donc, sur la représentation des deux fonctions, les segments les plus bas possible. Les deux droites se coupent en un point I. En I le prix des deux contrats sont identiques. Cela correspond à 180 km. On a donc :
- Si l'on parcourt moins de 180 km, le contrat N°1 est plus avantageux.
 - Si l'on parcourt plus de 180 km, le contrat N°2 est plus avantageux.
 - Si l'on parcourt 180 km les deux contrats sont équivalents.

4) Retrouvons ces résultats par le calcul :

Pour déterminer l'abscisse du point I, il faut résoudre l'équation :

$$f(x) = g(x) \Leftrightarrow 30 + 0,40x = 57 + 0,25x \Leftrightarrow 0,40x - 0,25x = 57 - 30$$

$$\Leftrightarrow 0,15x = 27 \quad \text{soit} \quad x = \frac{27}{0,15} = 180$$

Pour connaître le contrat le plus avantageux, il faut déterminer le signe de la quantité $f(x) - g(x)$. Si cette quantité est négative, le contrat N°1 est plus avantageux, si elle est positive le contrat N°2 est plus avantageux.

$$f(x) - g(x) = 30 + 0,40x - 57 - 0,25x = -27 + 0,15x$$

Cette quantité s'annule pour $x = 180$, on peut alors remplir un tableau de signes :

x	0	180	500
$-27 + 0,15x$		-	+

On retrouve alors les résultats de la solution graphique.

Remarque : On peut créer une nouvelle fonction h , définie sur $[0 ; 500]$, qui à un nombre x de km parcourus associe le tarif le plus avantageux. Il s'agit d'une fonction affine définie par morceaux :

$$h : \begin{cases} h(x) = 30 + 0,40x & \text{si } x \in [0 ; 180] \\ h(x) = 57 + 0,25x & \text{si } x \in [180 ; 500] \end{cases}$$

On a représenté cette fonction en pointillé rouge sur le graphique.

5.2 Autre application : conversion d'unité

En France l'unité usuelle de température est le degré Celsius qui est noté °C. Dans certains pays anglo-saxon, comme les États-Unis, l'unité usuelle est le degré Fahrenheit qui est noté °F. Tous les français en visite à Los Angeles ont éprouvé un certain malaise en écoutant la météo annoncée une température de 90° pour le lendemain. Il s'agit bien évidemment de degré Fahrenheit. Effaçons ce malaise en convertissant les degrés Celsius en degré Fahrenheit à l'aide d'une fonction affine. Il faut bien évidemment deux informations pour déterminer cette fonction. Les changements d'états de l'eau – servant de base à la définition du degré Celsius – permettent la conversion :

- Quand l'eau gèle (0°C) un californien pense 32°F.
- Quand l'eau bout (100°C) le californien pense 212°F.

- 1) Dédire de ces renseignements l'expression de $f(x)$ où f est la fonction qui à une température x exprimée en degré Celsius associe la température $f(x)$ exprimée en degré Fahrenheit.
- 2) Représenter la fonction f pour une température comprise entre 0 et 50°C.
- 3) Utiliser ce graphique pour répondre aux questions suivantes :
 - Lorsqu'à Los Angeles le thermomètre indique 90°F, est-ce une température caniculaire ?
 - Un médecin américain s'inquiète-t-il quand le thermomètre d'un malade indique 100°F ?
 - A quelle température dans sa chambre d'hôtel, un touriste français à Los Angeles doit-il s'attendre ?
- 4) Retrouver ces résultats par le calcul.
- 5) Peut-on trouver une température qui s'exprime par le même nombre en °C et °F ?



- 1) D'après les états de l'eau, on a :

$$f(0) = 32 \quad \text{et} \quad f(100) = 212$$

Comme f est une fonction affine, elle est du type $f(x) = ax + b$, on a alors :

$$a = \frac{212 - 32}{100 - 0} = \frac{180}{100} = 1,8 \quad \text{et} \quad b = 32 \quad \text{ordonnée à l'origine}$$

La fonction f a donc pour expression : $f(x) = 1,8x + 32$

2) Pour représenter la fonction f pour $x \in [0 ; 50]$, on détermine les images extrêmes


$f(0) = 32$ donc la représentation passe par le point A(0 ; 32).

$f(50) = 1,8 \times 50 + 32 = 122$ donc la représentation passe par le point B(50 ; 122).

On prendra comme unité :

- 2 cm = 10°C sur l'axe des abscisses
- 1 cm = 10° F sur l'axe des ordonnées

On obtient alors :



3) • Graphiquement, une température de 90° F correspond à une température d'environ de 32° C. Une température de 90° F est tout à fait habituelle à Los Angeles.

• Graphiquement, une température de 100° F correspond à une température d'environ de 38° C. Un médecin s'inquiète donc nullement lorsque la température d'un malade est de 100° F.

• On peut prendre comme température d'une chambre d'hôtel climatisée 18° C. Graphiquement, on trouve alors 64° F. Un touriste français s'attend à avoir une température de 64° F dans sa chambre d'hôtel.

4) Pour retrouver ces résultats par le calcul il faut résoudre :

- Pour une température de 90°F

$$\begin{aligned}f(x) = 90 &\Leftrightarrow 1,8x + 32 = 90 \Leftrightarrow 1,8x = 90 - 32 \\ &\Leftrightarrow x = \frac{58}{1,8} \simeq 32,2\end{aligned}$$

- Pour une température de 100°F

$$\begin{aligned}f(x) = 100 &\Leftrightarrow 1,8x + 32 = 100 \Leftrightarrow 1,8x = 100 - 32 \\ &\Leftrightarrow x = \frac{68}{1,8} \simeq 37,8\end{aligned}$$

Cette température du corps a servi de référence pour définir le 100°F

- Pour une température de 18°C ,

$$f(18) = 1,8 \times 18 + 32 = 32,4 + 32 = 64,4$$

5) Si une température s'exprime par la même nombre en $^{\circ}\text{C}$ et $^{\circ}\text{F}$, alors on a :

$$\begin{aligned}f(x) = x &\Leftrightarrow 1,8x + 32 = x \Leftrightarrow 1,8x - x = -32 \\ &\Leftrightarrow 0,8x = -32 \quad \text{soit} \quad x = -\frac{32}{0,8} = -40\end{aligned}$$

Une température de -40° peut être aussi bien des $^{\circ}\text{C}$ que des $^{\circ}\text{F}$.
