

Angles orientés mesurés en radian

- Le **radian** est une unité d'angle définie comme l'arc entre deux points du cercle unité de longueur 1.
 - L'**angle** (\vec{u}, \vec{v}) est orienté de \vec{u} vers \vec{v} .
- On a les relations suivantes :
- $$(\vec{u}, \vec{v}) + (\vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u}, \vec{w})$$
- relation de Chasles
-
- $$(\vec{v}, \vec{u}) = -(\vec{u}, \vec{v})$$
- et
- $(-\vec{u}, \vec{v}) = (\vec{u}, \vec{v}) + \pi$
- Soit θ_1 et θ_2 **deux mesures** d'un même angle (\vec{u}, \vec{v}) :
 $\exists k \in \mathbb{R}, \theta_2 = \theta_1 + k2\pi \Leftrightarrow \theta_2 = \theta_1 [2\pi]$
 - θ **mesure principale** d'un angle (\vec{u}, \vec{v}) si $\theta \in]-\pi; \pi]$


Lignes trigonométriques

Dans le cercle unité, α est l'angle orienté :

$$\cos \alpha = \text{projété de } \alpha \text{ sur } (Ox) \\ = OA$$

$$\sin \alpha = \text{projété de } \alpha \text{ sur } (Oy) \\ = OB$$

$$\tan \alpha = \text{projété de } \alpha \text{ sur } (T) \\ = IC$$



Relations fondamentales

- $-1 \leq \cos a \leq 1, \forall a \in \mathbb{R}$
- $-1 \leq \sin a \leq 1, \forall a \in \mathbb{R}$
- $\forall a \in \mathbb{R}, \sin^2 a + \cos^2 a = 1$
- $\tan a = \frac{\sin a}{\cos a}, \forall a \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$
- $1 + \tan^2 a = \frac{1}{\cos^2 a}$

Lignes trigonométriques des angles remarquables

α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	∞

Angles orientés et trigonométrie

Valeurs de cosinus et sinus




Tableau de signes de cosinus et sinus

$\cos \theta \leq 0$	$\cos \theta \geq 0$
$\sin \theta \geq 0$	$\sin \theta \geq 0$
$\cos \theta \leq 0$	$\cos \theta \geq 0$
$\sin \theta \leq 0$	$\sin \theta \leq 0$

Formules d'addition

Soient a et b deux angles quelconques :

- Avec cosinus on « ne panache pas » :
$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$
- Avec sinus on « panache » :
$$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$

$$\sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$$

Formules de duplication et de linéarisation

1) Formule de duplication :

- $$\cos(2a) = \cos^2 a - \sin^2 a \\ = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a$$
- $$\sin(2a) = 2 \sin a \cos a$$

2) Formules de linéarisation

$$\bullet \cos^2 a = \frac{1 + \cos(2a)}{2} \quad \bullet \sin^2 a = \frac{1 - \cos(2a)}{2}$$

Symétries et compléments


$$\begin{aligned}\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) &= -\sin(x) \\ \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) &= \cos(x)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos(\pi - x) &= -\cos(x) \\ \sin(\pi - x) &= \sin(x)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos(\pi + x) &= -\cos(x) \\ \sin(\pi + x) &= -\sin(x)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) &= \sin(x) \\ \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) &= \cos(x)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos(-x) &= \cos(x) \\ \sin(-x) &= -\sin(x)\end{aligned}$$



Exemple d'application

Calculer $A = \cos \frac{\pi}{7} + \cos \frac{9\pi}{14} + \cos \frac{8\pi}{7} + \cos \frac{23\pi}{14}$

⚠ Il ne s'agit pas de déterminer la valeur de $\cos \frac{\pi}{7}$

$$\begin{aligned}A &= \cos \frac{\pi}{7} + \cos \frac{9\pi}{14} + \cos \frac{8\pi}{7} + \cos -\frac{5\pi}{14} \quad \text{car } \frac{23\pi}{14} = -\frac{5\pi}{14} [2\pi] \\ &= \cos \frac{\pi}{7} + \cos \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{7}\right) + \cos \left(\pi + \frac{\pi}{7}\right) + \cos \frac{5\pi}{7} \\ &= \cos \frac{\pi}{7} - \sin \frac{\pi}{7} - \cos \frac{\pi}{7} + \cos \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{7}\right) \\ &= -\sin \frac{\pi}{7} + \sin \frac{\pi}{7} \\ &= 0\end{aligned}$$

Applications des formules

- **Relations fondamentales :** Sachant que $\cos \frac{\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}+1}{4}$, calculer $\sin \frac{\pi}{5}$

$$\sin^2 \frac{\pi}{5} = 1 - \cos^2 \frac{\pi}{5} = 1 - \frac{5+2\sqrt{5}+1}{16} = \frac{10-2\sqrt{5}}{16} \quad \cos \frac{\pi}{5} > 0$$

$$\sin \frac{\pi}{5} = \frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{4}$$

- **Formules d'addition :**

$$\begin{aligned}\cos \frac{7\pi}{12} &= \cos \left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4}\right) = \cos \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} - \sin \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &= \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin \frac{\pi}{12} &= \sin \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) = \sin \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} - \cos \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &= \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}\end{aligned}$$

- **Formules de linéarisation :**

$$\cos^2 \frac{\pi}{8} = \frac{1 + \cos \frac{\pi}{4}}{2} = \frac{1 + \frac{\sqrt{2}}{2}}{2} = \frac{2 + \sqrt{2}}{4} \quad \cos \frac{\pi}{8} > 0 \quad \cos \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}$$

$$\sin^2 \frac{\pi}{8} = \frac{1 - \cos \frac{\pi}{4}}{2} = \frac{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}}{2} = \frac{2 - \sqrt{2}}{4} \quad \cos \frac{\pi}{8} > 0 \quad \sin \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2}$$