

Dans tous les exercices, on appellera  $C$  la courbe représentative de  $f$  dans le repère (dont les unités de longueur seront précisées dans chaque exercice).

**EXERCICE 1**

Soit la fonction définie sur  $[-6 ; 3]$  par :

$$f(x) = -x^2 - 4x + 5$$

- Calculer  $f'(x)$  puis étudier son signe.
- Dresser le tableau de variation de  $f$  sur  $[-6 ; 3]$ .
- Déterminer les points d'intersection de  $f$  avec les axes  $(Ox)$  et  $(Oy)$ .
- Déterminer les coefficients directeurs des tangentes  $(T_A)$ ,  $(T_B)$  et  $(T_C)$  à la courbe  $C$  aux points  $A$ ,  $B$  et  $C$  d'abscisses respectives  $-5$ ,  $-2$  et  $1$ .
- Construire dans un même repère  $(T_A)$ ,  $(T_B)$ ,  $(T_C)$  et  $C$  (Unités : 1 cm en abscisse et 0,5 cm en ordonnée).

**EXERCICE 2**

Soit la fonction définie sur  $[-1 ; 2]$  par :

$$f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 2$$

- Calculer  $f'(x)$  puis étudier son signe.
- Dresser le tableau de variation de  $f$  sur  $[-1 ; 2]$ .
- Déterminer le point d'intersection de  $f$  avec l'axe  $(Oy)$  et déterminer le coefficient directeur de la tangente en ce point.
- A l'aide du tableau de variation, indiquer sur quel(s) intervalle(s)  $C$  coupe l'axe  $(Ox)$ .
- Construire dans un repère la courbe  $C$  ainsi que ses tangentes (Unités : 2 cm en abscisse et 1 cm en ordonnée).

**EXERCICE 3**

Soit la fonction définie sur  $[-1 ; 3]$  par :

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 2$$

- Calculer  $f'(x)$  puis étudier son signe.
- Dresser le tableau de variation de  $f$  sur  $[-1 ; 3]$ .
- Déterminer le point d'intersection de  $f$  avec l'axe  $(Oy)$  et déterminer le coefficient directeur de la tangente en ce point.
- A l'aide du tableau de variation, indiquer sur quel(s) intervalle(s)  $C$  coupe l'axe  $(Ox)$ .
- Construire dans un repère la courbe  $C$  ainsi que ses tangentes (Unités : 2 cm en abscisse et 1 cm en ordonnée).

**EXERCICE 4**

Soit la fonction définie sur  $[-1,5 ; 3]$  par :

$$f(x) = \frac{x+1}{x+2}$$

- Calculer  $f'(x)$  puis étudier son signe.
- Dresser le tableau de variation de  $f$  sur  $[-1,5 ; 3]$ .
- Déterminer les points d'intersection de  $f$  avec les axes  $(Ox)$  et  $(Oy)$ .

- Déterminer les coefficients directeurs des tangentes aux points d'intersection avec les axes.
- Construire dans un repère la courbe  $C$  ainsi que ses tangentes (Unités : 2 cm en abscisse et 2 cm en ordonnée).

**EXERCICE 5**

Soit la fonction définie sur  $[-5 ; 5]$  par :

$$f(x) = \frac{x-1}{x^2+3}$$

- Calculer  $f'(x)$  puis étudier son signe.
- Dresser le tableau de variation de  $f$  sur  $[-5 ; 5]$ .
- Déterminer les points d'intersection de  $f$  avec les axes  $(Ox)$  et  $(Oy)$ .
- Construire dans un repère la courbe  $C$  ainsi que ses tangentes (Unités : 1 cm en abscisse et 6 cm en ordonnée).

**EXERCICE 6**

Soit la fonction définie sur  $[-2 ; 3]$  par :

$$f(x) = \sqrt{x+2} - 1$$

- Calculer  $f'(x)$  puis étudier son signe.
- Dresser le tableau de variation de  $f$  sur  $[-2 ; 3]$ .
- Déterminer les points d'intersection de  $f$  avec les axes  $(Ox)$  et  $(Oy)$ .
- Déterminer les coefficients directeurs des tangentes aux points d'intersection avec les axes.
- Construire dans un repère la courbe  $C$  ainsi que ses tangentes (Unités : 2 cm en abscisse et 2 cm en ordonnée).

**EXERCICE 7**

Soit  $f$  la fonction définie sur  $[-3 ; 4]$  par :

$$f(x) = x^4 - 2x^3 - 11x^2 + 12x$$

- Calculer  $f'(x)$
  - Vérifier que 3 est une racine de  $f'(x)$ .
  - Factoriser  $f'(x)$  sous la forme  $(x-3).P(x)$
  - Etudier le signe de  $P(x)$ .
  - En déduire le signe de  $f'(x)$ .
- Dresser le tableau de variation de  $f$  sur  $[-3 ; 3]$ .
- Vérifier que  $-3$ ,  $0$  et  $1$  sont des racines de  $f(x)$ .
  - Que peut-on en déduire pour  $C$  ?
  - Déterminer les coefficients directeurs des tangentes  $(T_A)$ ,  $(T_B)$  et  $(T_C)$  à la courbe  $C$  aux points  $A$ ,  $B$  et  $C$  d'abscisses respectives  $-3$ ,  $0$  et  $1$ .
- Construire dans un même repère  $(T_A)$ ,  $(T_B)$ ,  $(T_C)$  et  $C$  (Unités : 2 cm en abscisse et 0,2 cm en ordonnée).